

### KRYTERIA LABORATORYJNE

Wymagane spełnienie po  $\geq 1$  kryterium z obu grup (A. i B.)

#### A. MAŁOPŁYTKOWOŚĆ

PLT  $< 150\ 000/\text{mm}^3$  w surowicy krwi

Zmniejszenie poziomu PLT o  $> 25\%$  w porównaniu z poziomem początkowym

Poziom hemoglobiny w surowicy krwi:  
 $< 12\ \text{g/dL}$  u kobiet lub  $< 13\ \text{g/dL}$  u mężczyzn

Negatywny bezpośredni test antyglobulinowy  
(odczyn Coombsa, BTA)

Zwiększona aktywność LDH w surowicy krwi

#### B. NIEDOKRWISTOŚĆ

Zwiększona liczba retikulocytów  $> 100\ 000/\mu\text{L}$

Obniżone stężenie haptoglobiny w surowicy krwi

Liczba schistocytów w erytrogramie  $> 1\%$

Odsetek fragmentocytów (FRC) w morfologii krwi  
 $> 2,5\%$

### OBJAWY UKŁADOWE

Wymagane spełnienie  $\geq 1$  kryterium

#### OBJAWY NEUROLOGICZNE

Splątanie, ból głowy, drgawki, przejściowe ogniskowe zaburzenia neurologiczne, afazja, diplopia, osłabienie lub drętwienie kończyn, udar, zespół PRES, wgłobienia OUN, obrzęk mózgu

#### ZABURZENIA CZYNNOŚCI NEREK

Ostre uszkodzenie nerek, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, nieprawidłowy wynik badania ogólnego moczu

#### ZABURZENIA PRZEWODU POKARMOWEGO

Biegunka niezależnie od domieszki krwi, nudności, wymioty, ból brzucha, nieżyt żołądkowy, zapalenie trzustki

#### ZABURZENIA KARDIOLOGICZNE

Zawał serca, nadciśnienie tętnicze, stenoza aortalna, niewydolność serca, arytmia, nagły zgon sercowy

#### OBJAWY PŁUCNE

Duszność, krwotok płucny, obrzęk płuc, niewydolność oddechowa

#### ZABURZENIA NARZĄDU WZROKU

Ból oka, rozmazany obraz, okluzja naczyń, krwotok oczny, retinopatia

#### INNE